

Ú ž i t k o v o s ť. V ľudovom liečiteľstve sa vňať obsahujúca glykozidy kardenolidového typu (napr. *erysimoid* a *helvetikozid*) používa ako kardiotonikum (má podobné účinky na srdce ako *Digitalis purpurea* L.); z bylí sa pripravovala náhrada za strofantín. Otrava semenami je známa u koní (D e y l e t U š á k 1956).

## 2. *Erysimum crepidifolium* R c h b.

Horčičník škardolistý

Ic.: Tab. 23, fig. 2, p. 211

*Erysimum crepidifolium* R c h b. Icon. Bot. Pl. Crit. 1, p. 8, 1823.

Syn.: *E. cheiranthus* J. P r e s l e t C. P r e s l 1819.

Dvojrročná bylina. Koreň na vrchole ca 0,5 cm hrubý, drevnatejúci, svetlohnedý, bohato rozkonárený, bočné korene takmer rovnovážne odstavajúce. Byľ jednoduchá alebo rozkonárená, oblá, jemne ryhovaná, tuhá, 12–63 cm vysoká, asi do 2/3 fialkastá, v hornej tretine sivo modrastozelená, na báze odstavajúco chlpatá (chlpy len vidlicovité), smerom k vrcholu roztrúsene až riedko odstavajúco chlpatá. Listy ružice a byľové listy stopkaté; stopka listov 0,5–4 cm dlhá, husto chlpatá (chlpy len vidlicovité); čepeľ kopijovitá, na okraji riedko zúbkatá alebo nerovnako mnohozárezová, na vrchole tupo končísa, 1,1–4×0,3–0,7 cm veľká, žltozelená až pieskovožltá, na líci aj na rube pritisnuto až mierne odstavajúco chlpatá (chlpy vidlicovité a 3-ramenné), na báze a na hlavnej žile pokrytá len vidlicovitými chlpmi; listy v dolnej polovici byľe stopkaté; stopka 0,8–2,5 cm dlhá; čepeľ nepravidelne mnohozárezová, 1,5–6,5×0,2–0,5 cm veľká, sivozelená, zelenkastá alebo žltozelená s fialkastým nádychom; odenie ako pri listoch v prízemnej ružici; listy v hornej polovici byľe sediace, podlhovasté, riedko zúbkaté, 2,1–5,2×0,2–0,5 cm veľké, hnedozelené; odenie ako pri nižšie postavených byľových listoch. Vreteno súkvetia zväčša roztrúsene chlpaté až chlpaté (chlpy prevažne vidlicovité). Listene úzko podlhovasté, 1–2×0,1–0,25 cm veľké, trávovozelelené až sivochlpaté, na líci aj na rube pritisnuto až odstavajúco roztrúsene chlpaté až chlpaté. Stopky kvetov do 0,5 mm hrubé, 2–3 mm dlhé, sivozelené, roztrúsene pritisnuto chlpaté (chlpy len vidlicovité). Kališné listy úzko elipsovité, na okraji s blanitým lemom, 7×1–1,5 mm veľké, belavé až sivozelené, na vonkajšej strane husto pritisnuto chlpaté (chlpy prevažne vidlicovité), na vnútornej holé. Korunné lupienky 10–12 mm dlhé, bledosírovožlté (ako pri *E. diffusum*); lupene 4,5–5×2–2,5 mm veľké, vonkajšia strana riedko chlpatá (chlpy vidlicovité a 3-ramenné), vnútorná holá. Tyčinky 5–7 mm dlhé; peľnice 2–2,5 mm dlhé, smotanovobiele, holé. Stopky plodov 4-hranné, priamo odstavajúce až rozkladité, 3–5 mm dlhé, 0,5 mm hrubé, sivozelené so striebřistým nádychom, pritisnuto chlpaté (chlpy len vidlicovité). Šešule 4-hranné, k vretenu mierne pritisnuté až šikmo odstavajúce, bez čnelky 25–70×0,5–0,9 mm veľké, hnedasto sivozelené, husto pritis-